

**CLOROCALCIN®**  
Picături orale soluție, 12,2 %**Compoziție:**

100 g picături orale soluție conțin clorură de calciu dihidrat 12,2 g și excipienți: glicerină, apă purificată.

**Grupa farmacoterapeutică:** Preparate din calciu.

**Indicații terapeutice**

*Clorocalcin* picături orale, soluție este indicat în:

- stări ce necesită un aport sporit de calciu: sarcina, alăptare, perioada de creștere rapidă, copilărie, hipocalcemie datorată procesului de îmbătrânire;
- rahitism – în asociere cu vitamina D;
- spasmofilie, tetanie calciprivă;
- boli ale sistemului osos – osteoporoza, osteomalacie;
- hemoragii, hemoptizii, hemoragii postoperatorii, hemoragii cerebrale, epistaxis;
- albuminurii;
- stări alergice: urticarie, edem Quincke, boala serului.

**Contraindicații**

Este contraindicată administrarea produsului în: insuficiența renală gravă, nefrolitiază calcică, hiperparatiroidism, hipercalcemie, hipercalciurie, calcificări tisulare, hipervitaminoza D, metastaze osoase sau în ulcer gastro-duodenal.

Nu se folosesc săruri de calciu în tratarea hipocalcemiei cauzată de insuficiența renală și la bolnavi cu acidoză respiratorie.

**Precauții**

Nu sunt necesare în cazul administrării corecte a produsului.

**Interacțiuni**

S-au semnalat cazuri de hipercalcemie la administrarea concomitentă de săruri de calciu și vitamina D (crește absorbția gastro-intestinală a calciului) sau diuretice tiazide (scade eliminarea urinară a calciului).

Sărurile de calciu scad absorbția unor medicamente ca: fluoruri, unele fluorochinolone, tetraciclone, fenitoina, estramustina, săruri de fer. Acestea se administrează la cel puțin trei ore diferență de clorura de calciu.

**Atenționări speciale**

Concentrația de calciu în plasma trebuie atent monitorizată în cazul pacienților cu insuficiență renală și în cazul administrării concomitente a unor doze mari de vitamina D.

Produsul se utilizează cu precauție în caz de antecedente de ulcer gastro-duodenal.

Imobilizarea prelungită poate fi însoțită de hipercalcemie, hipercalciurie; în acest caz tratamentul cu calciu poate fi administrat doar după restabilirea mobilității.

Pentru informații suplimentare adresați-vă medicului.

*Sarcina și alăptarea:*

Nu sunt necesare precauții dacă medicamentul este corect administrat.

*Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje*

Produsul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Doze si mod de administrare**

Doza recomandată este:

*La copii sub 10 ani:*

- Recalcifiant: 1 picătura pe an de vârstă și zi;
- Hemostatic: 5 picături pe an de vârstă și zi;
- Antialbuminuric: 20 de picături pe zi;
- Antialergic: 15 - 45 picături pe zi;
- Spasmofilie: 20 picături de 3-6 ori pe zi.

*La adulți:*

- Recalcifiant: 10 picături de 2 ori pe zi;
- Hemostatic: 20 picături de 4 ori pe zi;
- Antialbuminuric: 15 -35 picături pe zi;
- Antialergic: 20 picături de 4 ori pe zi.

Un g soluție conține 16 picături, iar o picătură conține aproximativ 2 mg calciu ionic.

Pentru informații suplimentare în privința dozelor a modului de administrare și a duratei tratamentului adresați-vă medicului.

### **Reactii adverse**

În cursul tratamentului cu *Clorocalcin* pot apărea următoarele reacții adverse: constipație, greață, dureri epigastrice, diaree.

### **Supradozaj**

Administrarea unor cantități excesive de *Clorocalcin* poate determina apariția simptomelor de hipercalcemie: anorexie, greață, vomă, constipație, dureri abdominale, slăbiciune musculară, polidipsie, poliurie, calculi renali, și, în cazuri severe aritmii cardiace și comă.

Supradozarea este favorizată de administrarea concomitentă de vitamina D.

Hipercalcemia ușoară, asimptomatică, se tratează prin oprirea administrării sării de calciu, eventual, a vitaminei D și ingerarea unor cantități mari de fluide. Simptomele severe de hipercalcemie necesită rehidratare prin perfuzare i.v. de soluție 0,9% de clorură de sodiu pentru a crește diureza calciului. În același scop se pot administra furosemid sau alte diuretice de ansă.

### **Păstrare**

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

### **Ambalaj**

Cutie cu un flacon din sticlă brună, prevăzut cu picurător a 50 ml picături orale, soluție.

### **Producător**

S.C. Biofarm S.A., România

### **Detinătorul Autorizatiei de punere de piață**

S.C. Biofarm S.A.,

Str. Logofătul Tăutu, nr. 99, sector 3, București, România

### **Data ultimei verificări a prospectului**

Mai, 2005