

Prospect: Informații pentru utilizator**Engystol comprimate**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Engystol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Engystol
3. Cum să utilizați Engystol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Engystol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Engystol și pentru ce se utilizează

Engystol este un medicament homeopat utilizat ca tratament adjuvant în răceli și sindroame de tip gripal la adulți și copii.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Engystol**Nu utilizați Engystol:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Engystol, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acțiunea unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de stilul de viață inadecvat, de o dietă hipercalorică sau de consumul de etanol, tutun, stimulante.

Engystol împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Nu se cunoaște dacă Engystol influențează efectul altor medicamente sau dacă alte medicamente influențează efectul Engystol.

Engystol împreună cu alimente, băuturi și alcool

Acțiunea unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de stilul de viață inadecvat, de o dietă bogată sau de consumul de etanol, tutun, stimulante.

Ca orice medicament homeopat, Engystol se va lua la distanță de mese.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Pentru acest medicament nu există studii clinice referitoare la efectele în timpul sarcinii și alăptării. De aceea nu trebuie utilizat în timpul sarcinii sau alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Engystol nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Engystol conține lactoză.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Engystol

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani	1 comprimat de 3 ori pe zi.
În cazuri acute: se poate lua câte 1 comprimat la	fiecare 30 de minute sau la 1 oră.
	Nu trebuie să luați mai mult de 12 comprimate pe zi.
Copii cu vârsta cuprinsă între 6 la 11 ani	1 comprimat de 2 ori pe zi.
	În cazuri acute: se poate lua câte 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la de 8 ori pe zi.
Copii cu vârsta cuprinsă între 2 la 5 ani	1 comprimat de 1-2 ori pe zi.
În cazuri acute: se poate lua câte 1 comprimat la	fiecare 1-2 ore, până la de 6 ori pe zi.
Copii cu vârsta cuprinsă între 0 la 1 an	1 comprimat o dată pe zi.
	În cazuri acute: se poate lua câte 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la de 4 ori pe zi.

Mod de utilizare

Administrare orală.

Lăsați comprimatele să se dizolve în gură înainte de înghițire, cu cel puțin 30 minute înainte de masă.

Utilizarea la copii

La copii, comprimatele se pot zdrobi și se pot administra cu o cantitate suficientă de apă.

Durata utilizării:

Dacă starea se înrăutățește sau simptomele nu se ameliorează în decurs de 5 zile, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

Dacă utilizați mai mult Engystol decât trebuie

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitați să utilizați Engystol

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luați doza următoare la ora obișnuită.

Dacă încetați să utilizați Engystol

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse foarte rare

- urticarie.

Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome, trebuie **să întrerupeți utilizarea Engystol și să vă adresați medicului dumneavoastră** sau să mergeți la secția de urgență a celui mai apropiat spital.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Engystol

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați Engystol după data de expirare înscrisă pe cutie sau flacon, după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termen de valabilitate după prima deschidere: 12 luni.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Engystol

Substanțele active sunt: *Vincetoxicum hirundinaria D 6*, *Vincetoxicum hirundinaria D 10*, *Vincetoxicum hirundinaria D 30*, *Sulfur D 4*, *Sulfur D 10*.

Fiecare comprimat (301.5 mg) conține:

<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	D 6	75 mg
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	D 10	75 mg
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	D 30	75 mg
<i>Sulfur</i>	D 4	37.5 mg
<i>Sulfur</i>	D 10	37.5 mg

Celelalte componente sunt: lactoză, stearat de magneziu.

Cum arată Engystol și conținutul ambalajului

Engystol se prezintă sub formă de comprimate rotunde, plane, cu fațetă de culoare albă până la aproape albă.

Ambalaj

Cutie cu un flacon din polipropilenă de culoare albă, închis cu dop din polipropilenă de culoare albă conținând 50 comprimate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. – Reckeweg-Str. 2-4

76532-Baden Baden

Germania

Tel: 0049 (0)7221 501 00

Fax: 0049 (0)7221 501 210

E-Mail: info@heel.de

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2019.