

RHINOIL

Picături nazale, soluție

Compoziție

100 ml picături nazale, soluție conțin: vitamina A palmitat 0,9 g, ulei de anason 0,8 g, ulei de eucalipt 0,7 g, ulei de mentă 0,6 g, camfor 0,15 g și excipienți: butilhidroxianisol, ulei rafinat de floarea soarelui.

Grupa farmacoterapeutică: Preparate nazale, decongestionante și alte preparate nazale de uz topic, alte preparate nazale, combinații

Indicații terapeutice

Adjuvant în tratamentul rinitelor și rino-faringitelor acute și cronice, în sinuzite, în rinită cronică atrofică simplă, în ozenă, în edem postoperator al mucoasei după intervenții endonazale.

Contraindicații

Hipersensibilitate la oricare din componenții produsului.
Copii cu vârsta sub 7 ani.
Rino-sinuzite alergice.
Astm bronșic sau epilepsie.

Precauții

Administrarea produsului la nivelul feței sau în regiunea nazală la copii până la vârsta de 7 ani, poate determina spasm glotic sau bronșic până la simptome asemănătoare astmului bronșic sau chiar insuficiență respiratorie și moarte prin asfixie. De aceea produsul este contraindicat la această grupă de vârstă.

A nu se administra pe cale orală.

Se va evita aplicarea la nivelul mucoasei conjunctivale.

Interacțiuni

Nu sunt cunoscute.

Incompatibilități

Nu este cazul.

Atenționări speciale

Pentru informații suplimentare în privința utilizării produsului adresați-vă medicului.

Sarcina și alăptarea

Produsul nu se administrează femeilor gravide sau celor care alăptează.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Produsul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze și mod de administrare

Copii peste 7 ani

Doza recomandată este de 1-2 picături, în fiecare nară, administrate sub formă de instilații sau tamponament nazal de 2 ori pe zi, timp de 4 zile sau la indicația medicului.

Adulți

Doza recomandată este de 2-3 picături, în fiecare nară, administrate sub formă de instilații sau tamponament nazal de 3 ori pe zi, timp de 5-6 zile sau la indicația medicului.

Instrucțiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării și manipularea sa

Nu sunt necesare.

Reacții adverse

La pacienții cu hipersensibilitate la unul din componenții produsului pot apărea reacții alergice. La unii pacienți poate apărea o iritație locală.

De aceea, ca măsură de precauție este necesară testarea sensibilității individuale la substanțele active și excipienți.

În general alte reacții adverse pot fi evitate în cazul administrării corecte a produsului.

Supradozaj

Supradozajul apare în special în cazul administrării accidentale a unor doze mari de Rhinoil pe cale orală, a produsului. Simptomele care apar includ: simptome gastro-intestinale, scăderea tensiunii arteriale, tulburări circulatorii, colaps, simptome respiratorii care pot evolua până la asfixie, delir, etc. Supradozajul la copii, poate apărea la doze inferioare la care apare la adult.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu un flacon din sticlă brună, prevăzut cu picurător, a 10 ml picături nazale, soluție.

Producător

S.C. TIS Farmaceutic S.A., România

Detinătorul Autorizației de punere de piață

S.C. TIS Farmaceutic S.A.,

Str. Industriilor nr. 16, sector 3, București, România

Data ultimei verificări a prospectului

Aprilie, 2005