

Prospect: Informații pentru utilizator**Septanazal 1 mg/50 mg/ml spray nazal, soluție**

Clorhidrat de xilometazolină/Dexpantenol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Septanazal și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Septanazal
3. Cum să utilizați Septanazal
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Septanazal
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Septanazal și pentru ce se utilizează

Septanazal spray nazal conține clorhidrat de xilometazolină și dexpantenol.

Clorhidratul de xilometazolină contractă rapid vasele de sânge din mucoasa nazală și reduce congestia acesteia, precum și secreția de mucus. În acest fel, dispără senzația de blocaj al nasului. Dexpantenoul este un derivat al acidului pantotenic, o vitamină care permite vindecarea rănilor și protejează mucoasa nasului.

Septanazal este utilizat:

- pentru decongestionarea mucoasei din inflamațiile nazale (rinite) și pentru vindecarea leziunilor mucoasei,
- pentru ameliorarea inflamației non-alergice a mucosei nazale (din rinita vasomotorie),
- pentru tratamentul respirației nazale afectate după chirurgia nazală.

Poate fi utilizat la adulți și copii și adolescenți cu vârstă peste 6 ani.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Septanazal**Nu luați Septanazal:**

- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră sunteți alergic la clorhidrat de xilometazolină, dexpantenol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct.6.),
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți o inflamație uscată, cu formare de cruste,

- a mucoasei nazale (*rhinitis sicca*),
- dacă dumneavoastră sau copilului dumneavoastră vi s-a îndepărtat chirurgical glanda hipofiză sau vi s-au efectuat alte intervenții chirurgicale la care a fost expus meningele (membrana care acoperă creierul).

Acest medicament nu trebuie utilizat la copiii cu vârstă sub 6 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Septanazal, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră luați inhibitori de monoaminoxidază (IMAO) sau alte medicamente care pot crește tensiunea arterială,
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți tensiune crescută în interiorul ochiului, în special glaucom cu unghi închis,
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți boli cardiovasculare severe (de exemplu boala coronariană, tensiune arterială crescută),
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți tumoră a medulosuprarenalei (feocromocitom),
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți boli metabolice (de exemplu, activitate crescută a glandei tiroide și prezență creștere a transpirației, creștere a temperaturii corpului, creștere a numărului de bătăi ale inimii sau diabet zaharat),
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți o boala metabolică numită porfirie,
- dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți prostată mărită.

Utilizarea în rinită cronică se poate face numai sub supraveghere medicală din cauza pericolului de atrofie a mucoasei nazale.

Utilizarea incorectă sau excesul de spray poate determina reacții adverse sistemice, în special la copii (vezi pct. Reacții adverse posibile).

Nu este indicat ca dumneavoastră sau copilul dumneavoastră să utilizați acest medicament dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră deja folosiți:

- orice alte medicamente pentru tratamentul gripei,
- orice alte medicamente pentru răceală și tuse care conțin substanțe simpatomimetice (medicamente utilizate pentru tratarea congestiei nazale, cum sunt pseudoefedrină, efedrină, fenilefrină, oximetazolină, xilometazolină, tramazolină, nafazolină, tuaminoheptan).

Utilizarea concomitentă a acestor medicamente împreună cu Septanazal poate crește riscul reacțiilor adverse la nivelul sistemului cardiovascular și sistemului nervos central.

Evitați contactul direct al medicamentului cu ochii.

Copii și adolescenți

Nu utilizați doze mai mari decât cele recomandate de către medic. Vă rugăm întrebați medicul despre durata tratamentului și frecvența utilizării medicamentului la copii.

Septanazal este recomandat numai copiilor și adolescenților cu vârstă de peste 6 ani. Pentru copii cu vârstă sub 6 ani, este disponibil Septanazal pentru copii spray nazal, care conține doze mai mici de substanțe active.

Dumneavoastră trebuie să supravegheați administrarea medicamentului la copiii și adolescenții cu vârstă sub 12 ani.

Dacă copilul nu se simte mai bine, sau se simte mai rău după 3 zile de tratament, vă rugăm să vă adresați medicului.

Septanazal împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sa farmacistului dacă luați, ati luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Utilizarea concomitentă a Septanazal cu anumite medicamente pentru tratamentul depresiei (inhibitori ai monoaminoxidazei de tipul tranciprominei sau antidepresive triciclice), precum și cu

medicamente care cresc tensiunea arterială, poate duce la creșterea tensiunii arteriale, ca rezultat al efectelor acestor substanțe asupra sistemului cardiovascular.

Utilizarea concomitentă a Septanazal și a unor medicamente pentru tratamentul gripei sau pentru tuse și răceală care conțin substanțe simpatomimeticice (medicamente utilizate pentru tratarea congestiei nazale, cum sunt pseudoefedrină, efedrină, fenilefrină, oximetazolină, xilometazolină, tramazolină, nafazolină, tuaminoheptan) poate crește riscul reacțiilor adverse la nivelul sistemului cardiovascular și sistemului nervos central.

Adresați-vă medicului înaintea utilizării Septanazal, dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră utilizați oricare dintre aceste medicamente.

Septanazal împreună cu alimente și băuturi

Puteți administra acest medicament cu sau fără alimente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptăți, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament nu trebuie utilizat în timpul sarcinii deoarece nu există date privind siguranța la gravide.

Acest medicament nu trebuie utilizat în timpul alăptării, deoarece nu se cunoaște dacă clorhidratul de xilometazolina trece în laptele matern.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Dacă este utilizat conform recomandărilor, nu se așteaptă ca acest medicament să vă afecteze capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să luați Septanazal

Luați întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată pentru adulți este de un puf în fiecare nară, până la de trei ori pe zi, după necesități. Dozele depind de sensibilitatea individuală și rezultatul clinic. Nu utilizați acest medicament mai mult de 7 zile. Puteți relua tratamentul după o pauză de câteva zile.

Mod de administrare

Înlăturați capacul protector. Înainte de prima utilizare sau dacă sprayul nu a mai fost utilizat de mult timp, pompați de câteva ori până la apariția unui nor fin de substanță.



Introduceți vârful dispozitivului în poziție cât mai verticală posibil într-o nară și pompați o dată. În timpul procedurii, respirați pe nas. La nevoie, repetați procedura la cealaltă nară.

După fiecare utilizare, ștergeți vârful sprayului cu un șervețel de hârtie și puneți la loc capacul protector.

2.



Utilizarea prelungită sau utilizarea unor doze mari de medicament poate determina o umflare premanentă și, posibil, subțierea mucoasei nazale.

Pacienții cu tensiune crescută în interiorul ochiului (glaucom), în special glaucom cu unghi închis, trebuie să se adreseze medicului înainte de a utiliza acest medicament.

Utilizarea la copii și adolescenți

Doza recomandată pentru copiii și adolescenții cu vîrstă peste 6 ani este de un puf în fiecare nară de până la 3 ori pe zi, după necesitate. Vă rugăm întrebați întotdeauna medicul despre durata tratamentului la copii.

Dacă luați mai mult Septanazal decât trebuie

Dacă luați mai mult medicament decât trebuie sau ati înghițit accidental cantități mari din acest medicament, pot apărea următoarele reacții adverse: contracție a pupilelor (mioză), dilatare a pupilelor (midriază), febră, transpirații, paloare a pielii, colorare albăstruiie a buzelor (cianoză), greață, convulsii, probleme la nivelul inimii și vaselor de sânge (creștere a frecvenței bătăilor inimii, scădere a frecvenței bătăilor inimii, tulburări ale ritmului inimii, colaps circulator, stop cardiac, creștere a tensiunii arteriale), afecțiuni respiratorii (edem pulmonar, probleme cu respirația) și tulburări psihice.

De asemenea, puteți avea somnolență, scădere a temperaturii corpului, reducere a numărului bătăilor inimii și scădere a tensiunii arteriale, oprire a respirației și comă.

Dacă observați oricare dintre aceste simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să luați Septanazal

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Septanazal

Puteți întrerupe utilizarea Septanazal atunci când nu mai aveți nevoie.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):

- reacții de hipersensibilitate, cum sunt umflare a pielii și mucoaselor, erupții trecătoare ale pielii, mâncărimi.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- palpitații (conștientizare a bătăilor inimii), tahicardie (bătăi mai frecvente ale inimii), tensiune arterială crescută (hipertensiune arterială).

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane):

- agitație, tulburări ale somnului, oboselă (somnolență, sedare), dureri de cap, halucinații (în special la copii),
- tulburări ale ritmului inimii (aritmii),
- umflare a mucoasei nazale (după intreruperea tratamentului), săngerări nazale,
- episoade convulsive (convulsii, în special la copii).

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- arsuri și uscaciune a mucoasei nazale, strănut.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

5. Cum se păstrează Septanazal

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Termen de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 3 luni.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Septanazal

- Substanțele active sunt: clorhidrat de xilometazolină și dexpantenol.
Fiecare ml de spray nazal, soluție, conține clorhidrat de xilometazolină 1 mg și dexpantenol 50 mg.
Un puf de 0,1 ml spray nazal, soluție, conține clorhidrat de xilometazolină 0,1 mg și dexpantenol 5,0 mg.
- Celelalte componente (excipienți) sunt: dihidrogenofosfat de potasiu, fosfat disodic dodecahidratat și apă purificată.

Cum arată Septanazal și conținutul ambalajului

Soluție limpede, incoloră.

Septanazal este disponibil în cutii cu flacon din material plastic a 10 ml spray nazal, cu dispozitiv de pulverizare. 10 ml spray nazal, soluție asigură 100 pufuri de spray.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

| | |
|---------------|---|
| Republic Cehă | Septanazal pro dospělé |
| Bulgaria | Септаназал за възрастни (Septanazal for adults) |
| Estonia | Täiskasvanute Septanazal |
| Ungaria | Septanazal orrspray felnőtteknek |

| | |
|-------------------------|---|
| Lituania | Septanazal suaugusiems |
| Letonia | Septanazal 1 mg/50 mg/ml deguna aerosols, šķīdums pieaugušajiem |
| Polonia | Septanazal dla dorosłych |
| România | Septanazal |
| Repubica Slovacă | Septanazal sprej pre dospelých |
| Slovenia | Septanazal za odrasle |

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2013