

Strepsils Lemon fără zahăr pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzilic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Lemon fără zahăr pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzilic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4 diclorbenzilic 1,2 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține maltitol (E 965). (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastilă
8 pastile
16 pastile
24 pastile

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, Corpul A
Etaj 5, sector 1, București, România
{Sigla Reckitt Benckiser}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

6526/2014/01 – {8 pastile}
6526/2014/02 – {16 pastile}
6526/2014/03 – {24 pastile}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Strepsils Lemon fără zahăr aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.
Strepsils Lemon fără zahăr se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.
Medicament antiseptic pentru calmarea durerilor în gât.
Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.
Efect antibacterian, antifungic și antiviral

Mod de administrare:

Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Lemon fără zahăr la 2-3 ore; pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Strepsils Lemon fără zahăr}

Strepsils Lemon fără zahăr pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ
BLISTER DIN PVC-PVDC/Al**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Strepsils Lemon fără zahăr pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzilic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII

{Sigla S de la Strepsils}