

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram de Voltaren Emulgel conține diclofenac dietilamină 11,6 mg, corespunzător la diclofenac sodic 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și carbomeri, macrogol cetostearil eter, caprilocaprat de cocoil, dietilamină, alcool izopropilic, parafină lichidă, parfum cremă 45 (conținând benzoat de benzil), propilenglicol, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
20 g
50 g
100 g
150g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu utilizați dacă sunteți alergic la diclofenac, acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare cum ar fi ibuprofenul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One
Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România

Sigla GlaxoSmithKline

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13704/2021/01- {pentru cutia cu un tub din aluminiu cu capac alb cilindric, conținând 20 g gel}
13704/2021/02 - {pentru cutia cu un tub din aluminiu cu capac alb cilindric, conținând 50 g gel}
13704/2021/03 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate), cu capac alb cilindric, conținând 20 g gel}
13704/2021/04 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu capac alb cilindric, conținând 50 g gel}
13704/2021/05 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu capac alb cilindric, conținând 100 g gel}
13704/2021/06 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate (strat intern)) cu capac alb cilindric, conținând 150 g gel}
13704/2021/07 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu capac albastru triunghiular, conținând 50 g gel}
13704/2021/08 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu capac albastru triunghiular, conținând 100 g gel}
13704/2021/09 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu capac albastru triunghiular, conținând 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul.
Reduce durerea acută într-o oră.

Pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani

Aplicați Voltaren Emulgel de 3 sau 4 ori pe zi, pe suprafața dureroasă.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Voltaren Emulgel

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram de Voltaren Emulgel conține diclofenac dietilamină 11,6 mg, corespunzător la diclofenac sodic 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și carbomeri, macrogol cetostearil eter, caprilocaprat de cocoil, dietilamină, alcool izopropilic, parafină lichidă, parfum cremă 45 (conținând benzoat de benzil), propilenglicol, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
100 g
150g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu utilizați dacă sunteți alergic la diclofenac, acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare cum ar fi ibuprofenul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One
Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România

Sigla GlaxoSmithKline

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13704/2021/10 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu aplicator de tip trage/apasă și capac de protecție, conținând 100 g gel}

13704/2021/11 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/polietilenă de înaltă densitate) cu aplicator de tip trage/apasă și capac de protecție, conținând 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție instrucțiunile de aplicare de pe cutie sau prospect.
Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul.
Reduce durerea acută într-o oră.

Pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani

Aplicați Voltaren Emulgel de 3 sau 4 ori pe zi, pe suprafața dureroasă.

Instrucțiuni de aplicare

Îndepărtați capacul de protecție transparent



Deșurubați aplicatorul



Utilizați orificiul lateral al aplicatorului pentru a îndepărta sigiliul de siguranță în formă de stea din vârful tubului



Înșurubați aplicatorul pentru a-l atașa din nou la tub și trageți partea albă pentru a-l deschide



16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Voltaren Emulgel

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram de Voltaren Emulgel conține diclofenac dietilamină 11,6 mg, corespunzător la diclofenac sodic 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și carbomeri, macrogol cetostearil eter, caprilocaprat de cocoil, dietilamină, alcool izopropilic, parafină lichidă, parfum cremă 45 (conținând benzoat de benzil), propilenglicol, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
20 g
50 g
100 g
150g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu utilizați dacă sunteți alergic la diclofenac, acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare cum ar fi ibuprofenul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One
Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România

Sigla GlaxoSmithKline

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13704/2021/12 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock) cu capac alb cilindric, conținând 20 g gel}
13704/2021/13 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock) cu capac alb cilindric, conținând 50 g gel}
13704/2021/14 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock) cu capac alb cilindric, conținând 100 g gel}
13704/2021/15 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock) cu capac alb cilindric, conținând 150 g gel}
13704/2021/16 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock) cu capac albastru triunghiular, conținând 50 g gel}
13704/2021/17 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock) cu capac albastru triunghiular, conținând 100 g gel}

13704/2021/18 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock) cu capac albastru triunghiular, conținând 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul.
Reduce durerea acută într-o oră.

Pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani

Aplicați Voltaren Emulgel de 3 sau 4 ori pe zi, pe suprafața dureroasă.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Voltaren Emulgel

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram de Voltaren Emulgel conține diclofenac dietilamină 11,6 mg, corespunzător la diclofenac sodic 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și carbomeri, macrogol cetostearil eter, caprilocaprat de cocoil, dietilamină, alcool izopropilic, parafină lichidă, parfum cremă 45 (conținând benzoat de benzil), propilenglicol, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
100 g
150g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu utilizați dacă sunteți alergic la diclofenac, acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare cum ar fi ibuprofenul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.

Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One

Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România

Sigla GlaxoSmithKline

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13704/2021/19 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/ amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock) cu aplicator de tip trage/apasă și capac de protecție, conținând 100 g gel}

13704/2021/20 - {pentru cutia cu un tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/aluminiu/ amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock) cu aplicator de tip trage/apasă și capac de protecție, conținând 150 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție instrucțiunile de aplicare de pe cutie sau prospect.
Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul.

Reduce durerea acută într-o oră.

Pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani

Aplicați Voltaren Emulgel de 3 sau 4 ori pe zi, pe suprafața dureroasă.

Instrucțiuni de aplicare

Îndepărtați capacul de protecție transparent



Deșurubați aplicatorul



Utilizați orificiul lateral al aplicatorului pentru a îndepărta sigiliul de siguranță în formă de stea din vârful tubului



Înșurubați aplicatorul pentru a-l atașa din nou la tub și trageți partea albă pentru a-l deschide



16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Voltaren Emulgel

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub din aluminiu cu capac cu filet alb, cilindric, din polipropilenă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 g gel
50 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.
Sigla GlaxoSmithKline

Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/polietilenă de înaltă densitate), cu capac cu filet alb, cilindric, din polipropilenă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 g gel
50 g gel
100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.
Sigla GlaxoSmithKline
Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul
După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/polietilenă de înaltă densitate), cu capac cu filet albastru, triunghiular, din polipropilenă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

50 g gel
100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.
Sigla GlaxoSmithKline
Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/polietilenă de înaltă densitate), cu aplicator de tip trage/apasă și capac de protecție

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.
Sigla GlaxoSmithKline

Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul
După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock), cu capac cu filet alb, cilindric, din polipropilenă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 g gel
50 g gel
100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.
Sigla GlaxoSmithKline
Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul
După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
diclofenac dietilamină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock), cu capac cu filet albastru, triunghiular, din polipropilenă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

50 g gel
100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.
Sigla GlaxoSmithKline
Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul
După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

Tub laminat din aluminiu (polietilenă de joasă densitate/ aluminiu/amestec de polietilenă liniară de joasă densitate, polietilenă de înaltă densitate și aditiv masterbatch antiblock), cu aplicator de tip trage/apasă și capac de protecție

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

VOLTAREN EMULGEL 11,6 mg/g gel
Diclofenac dietilamină
Administrare cutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 g gel
150 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.
Sigla GlaxoSmithKline
Ameliorează durerea, reduce inflamația și edemul

După ambalarea pentru comercializare - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
După prima deschidere - a se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor